



**Hrvatska poljoprivredno-šumarska
savjetodavna služba**

Obavijest maslinarima

11.07.2018. Splitsko-dalmatinska županija

Na opažaćkim punktovim Splitsko-dalmatinske županije na kojima se prati let i brojnost maslinine muhe bilježi se ulov od 20 do 80 kom odraslih jedinki po lovci. Pregledom zaraženih plodova u priobalju i na otocima pronađeni su skoro svi razvojni stadiji maslinine muhe od svježe položenih jajašaca do ličinki mlađeg i starijeg stadija te kukuljica.

Upozoravamo maslinare koji do sada nisu obavili zaštitu maslinika da je provedu, jer se u protivnom očekuje veća zaraza.

Plod masline na većini lokaliteta je dobro razvijen ne pati od suše te je takav atraktivan za polaganje jaja, izuzev su lokaliteti na povišenim položajima i plićim tlima gdje su smežurani plodovi.

Trenutne temperature zraka još uvijek odgovaraju razvoju maslinine muhe te ne djeluju na usporavanje ili zaustavljanje razvoja maslinine muhe.

Za zaštitu nasada mogu se koristiti dozvoljeni pripravci na osnovi:

- **Dimetoata** (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfekthion, Rogor 40),
- **Fosmeta** (trgovački naziv Imidan 50 WG),
- **Deltametrina** (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Polec plus).

U maslinicima u kojima nema ostvarene zaraze može se koristiti metoda zatrovanih mamaca radi suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Žarko Kovačić dipl.ing.agr.